
 Unité Technique Interventionnelle	FORMULAIRE Informations avant réalisation d'une gastrostomie percutanée endoscopique pour nutrition entérale		Référence : FOR-UTI-CON-007	
			Création le 15/06/2010 Mise à jour le 14/12/2017	
			Page 1 sur 5	Version 2
Date : Nom : Fonction : Signature :	<u>REDACTION</u>	<u>VERIFICATION</u>	<u>APPROBATION</u>	
	Aurélie CHEVÉ  Patrick BERTHON IDE UTI 	Laurence MERCIER-POUSSARD FF de Cadre de Santé - UTI 	Dr Tony HALLAK  Gastroentérologie Dr Xavier JOST  Gastroentérologie	

ETIQUETTE PATIENT



Madame, Monsieur,

Votre état de santé vous empêche de vous nourrir et/ou de vous hydrater convenablement. Votre médecin vous propose la pose d'une gastrostomie percutanée endoscopique. La gastrostomie percutanée endoscopique permet de mettre en place, par les voies naturelles, une sonde dans l'estomac qui ressort à travers la peau de l'abdomen entre les côtes et le nombril.

Cette sonde va vous permettre de vous nourrir (nutrition entérale) et/ou de vous hydrater et/ou d'administrer vos médicaments. Selon l'avis de votre médecin, après la pose de la sonde, vous pourrez continuer à manger et à boire par la bouche.

Afin que vous soyez clairement informé(e) du déroulement de cet acte médical, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'informations. Le médecin est à votre disposition pour vous exposer en complément toute autre précision que vous souhaiteriez.

Quels sont les avantages de la gastrostomie percutanée endoscopique ?

La gastrostomie percutanée endoscopique est un geste simple et rapide dont la réalisation présente peu de risques. Il existe peu de contre-indications et votre médecin a pris soin de les rechercher avant de vous proposer cette technique.

La sonde de gastrostomie peut facilement être dissimulée sous les vêtements et est donc invisible pour les autres.

Le plus souvent, le geste est réalisé sous anesthésie générale mais en cas de contre-indication médicale ou de refus de votre part, ce geste peut être réalisé sous anesthésie locale.


Comment se préparer pour la gastrostomie percutanée endoscopique ?

Avant la pose de la sonde, si une anesthésie générale est prévue, vous aurez une consultation avec un médecin anesthésiste qui pourra répondre à toutes vos questions concernant l'anesthésie. Vous devrez arrêter tout traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire éventuel. Vous devrez avoir un prélèvement sanguin pour vérifier la coagulation, la numération formule sanguine et le ionogramme, et voir un cardiologue selon avis de l'anesthésiste.

Le jour de la pose, vous devrez prendre une douche (ou en cas d'impossibilité il vous sera fait une toilette au lit) avec un savon antiseptique. Vous devrez faire un bain de bouche avec une solution antiseptique. Si besoin, il sera fait un rasage de la paroi abdominale à la tondeuse. L'infirmière mettra en place une perfusion dans une veine du bras.

Durant les 6 heures précédant l'examen il faut être à jeun strict (sans boire, ni manger) sauf avis contraire du médecin qui réalisera votre examen. Il est nécessaire de ne pas fumer (la cigarette augmente la sécrétion gastrique qui peut compliquer l'anesthésie). Pour la prise d'un antalgique et/ou traitement important, il peut être pris avec une petite quantité d'eau, jusqu'à 2 heures avant tout examen quel qu'il soit.

Quelques minutes avant le geste, il vous sera injecté un antibiotique à titre préventif, qui a pour but de diminuer le risque d'infection, à moins que vous ne soyez déjà sous traitement antibiotique pour une autre raison. Il est important de signaler tout antécédent de réaction allergique même mineure.




Comment se déroule la gastrostomie percutanée endoscopique ?

Le geste est réalisé dans des conditions d'asepsie chirurgicale au bloc opératoire ou dans une salle du service d'endoscopie, spécifiquement équipée à cette fin, et dans tous les cas en présence d'un médecin anesthésiste-réanimateur.

Cette technique utilise un endoscope souple qui est introduit par la bouche. Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et les accessoires utilisés à usage unique selon un protocole institutionnel et validé ayant pour but de prévenir d'éventuelles transmissions d'infections.

L'endoscope est introduit par la bouche et poussé jusque dans l'estomac. Il permet de vérifier l'état du tube digestif et de repérer le point de la paroi abdominale où va être posée la sonde. A ce niveau, l'opérateur fait une courte incision de la peau au bistouri puis une ponction de l'estomac, qui permet d'en faire sortir la sonde. La sonde est maintenue en place par 2 collerettes de part et d'autres de la paroi.

SONDE DE GASTROSTOMIE



👉 Quelles complications peuvent survenir pendant l'intervention ?

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, expose à un risque de complication.

Les complications les plus fréquentes de la gastrostomie percutanée endoscopique sont :

- **L'infection de l'orifice** dans les jours qui suivent sa mise en place. Toutes les précautions sont prises pour limiter ce risque : antibiotique, désinfection du champ opératoire, conditions de stérilité pour la pose et pour la réalisation du pansement.
- **La douleur** : elle peut être plus ou moins importante. Des antidouleurs sont prescrits de façon systématique pour la limiter.

Les autres complications sont très rares et certaines peuvent nécessiter une intervention chirurgicale :

- **La blessure d'un segment digestif**
- **L'hémorragie** : une nouvelle endoscopie pour stopper l'hémorragie ainsi que des transfusions de sang ou de dérivés sanguins sont parfois nécessaires.
- **La péritonite** : elle peut survenir en cas de fuite de liquide entre la peau et l'estomac.



D'autres complications sont possibles mais restent exceptionnelles, telles que les troubles cardiovasculaires et respiratoires. Ces complications peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains traitements.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent au moment du geste, mais peuvent également se révéler quelques jours après l'intervention (douleurs abdominales et du thorax, vomissement de sang rouge ou noir, selles noires, fièvre, frissons...). Il est alors très important de contacter immédiatement le médecin et/ou l'anesthésiste qui se sont occupés de vous au numéro inscrit à la fin de ce document. En cas d'impossibilité de prendre contact avec eux, contactez très rapidement votre médecin traitant ou un service d'urgence.

Quelles sont les contraintes après la pose ?

Il peut vous être demandé de rester hospitalisé(e) pendant 12 à 48 h, suites à l'intervention, pour surveillance, pour débiter la nutrition entérale ou en cas de complication, ou jusqu'à 72 h pour vous apprendre à administrer la nutrition vous-même ou par un de vos proches.

Pendant une à deux semaines, le pansement sera refait tous les jours par une infirmière en utilisant un antiseptique.



Ne jamais laisser de compresse entre la peau et la collerette lors de la réfection du pansement.

Ensuite, le pansement pourra être fait 3 fois par semaine. Après un mois, l'orifice est généralement cicatrisé. Il n'est alors plus nécessaire de faire des soins antiseptiques et un nettoyage quotidien à l'eau et au savon suffit. Vous pourrez prendre des douches sans protection et des bains en protégeant la sonde avec un pansement imperméable.



**ATTESTATION DE RECUEIL D'INFORMATIONS PRÉALABLE
À LA RÉALISATION D'UNE GASTROSTOMIE PERCUTANÉE
ENDOSCOPIQUE POUR NUTRITION ENTÉRALE**

Je soussigné(e),

Madame, Monsieur.....

- Patient
- Représentant légal
- Personne de confiance

Certifie avoir pris connaissance du formulaire d'information joint.

Qui sera réalisée par le Docteur.....

Le.....

Et avoir reçu les réponses satisfaisantes à mes questions relatives à l'examen que je vais subir.

Le,.....

Signature du patient